

# QUANDO I DENTI SI NASCONDONO

SI PUÒ INTERVENIRE CON LA CHIRURGIA

La disodontiasi, vale a dire la difficoltà di un dente a spuntare naturalmente, è generalmente causata dalla mancanza di spazio nelle arcate dentarie. Denti inclusi, o mal posizionati, possono essere causa di infiammazione, dolori, malocclusioni e, più generalmente, di problemi di masticazione. La Dottoressa Marina Bobbo, responsabile del reparto chirurgico di Clinica Sorriso del Bambino, ci spiega come affrontare queste delicate situazioni.



➤ **Dottoressa Bobbo, come si fa a recuperare i denti che non scendono spontaneamente? Qual'è l'età migliore per intervenire?**

La cura della disodontiasi, più frequente nei denti del giudizio e nei canini superiori, richiede una particolare cautela poiché spesso sono anatomicamente vicini ad altre strutture importanti che se danneggiate possono presentare complicanze quali perdita della sensibilità. La scelta migliore è intervenire nella giovane età, quando i germi dei denti non sono ancora del tutto formati, e quindi risulta più facile e meno rischioso estrarli.

➤ **Un grande dubbio è "togliere o non togliere i denti del giudizio", lei cosa suggerisce?**

Raramente i denti del giudizio trovano spazio in arcata e quasi sempre è consigliabile toglierli prima che finiscano di formarsi, quindi entro i 17 anni. Gli esami radiografici come la panoramica, la radiografia del cranio e la TAC permettono di prevedere esattamente se ci sarà spazio sufficiente per i denti e se è opportuno estrarli preventivamente, con minori difficoltà e senza traumi (come a volte avviene invece per le estrazioni dei denti del giudizio nell'adulto..)

➤ **Ci sono altre situazioni di anomalie dentali da trattare chirurgicamente?**

**Tutti i denti mal posizionati che cercano di erompe, seguendo direzioni diverse da quelle normali, possono creare danni ai denti vicini e malocclusioni.**

Anche qui, una diagnosi precoce basata sulle radiografie e sull'esame delle arcate, permette di formulare un piano di trattamento per recuperare perfettamente i

denti in arcata e mantenerli in funzione tutta la vita.

➤ **Da quali esami viene preceduta la terapia chirurgica?**

Prima di procedere all'estrazione o al recupero del dente incluso, tramite interventi chirurgici e apparecchi ortodontici, nella nostra Clinica viene eseguita un'indagine approfondita del cavo orale anche attraverso il Dentascan, una tecnica radiografica dettagliata tipo TAC ma con un dosaggio di radiazioni irrisorio che fornisce delle immagini tridimensionali accurate delle strutture ossee e dentali, mostrandoci informazioni necessarie all'intervento quali la posizione delle radici nell'osso e la vicinanza del dente interessato a strutture anatomiche delicate quali seno mascellare e nervi.

➤ **E' consigliabile estrarre i denti da latte quando i permanenti crescono in doppia fila?**

La cosiddetta "eruzione ectopica" dei denti permanenti (cioè la loro comparsa in bocca dietro ai denti da latte) non è dovuta alla permanenza dei denti decidui, ma alle insufficienti dimensioni della arcata. Anziché estrarre i dentini da latte (con conseguente trauma e dolore del bambino, che comprometteranno inutilmente i suoi futuri approcci col dentista) è più opportuno intervenire sulle cause, stimolando la crescita della bocca con apparecchi idonei ed attendere che i denti permanenti occupino il loro spazio facendo consumare e cadere spontaneamente i denti da latte.

➤ **Il filetto (frenulo) va tagliato per permettere la chiusura dello spazio tra gli incisivi superiori?**

Non è quasi mai necessario! Novantanove volte su cento infatti lo spazio si chiude spontaneamente e quindi l'intervento di frenulectomia risulta inutile e doloroso.

Al contrario invece il frenulo linguale, se trattiene il movimento della lingua verso l'avanti o l'alto, va sempre inciso e poi va fatta una rieducazione della mobilità.



**Dottoressa MARINA BOBBO**  
ODONTOIATRA

*Laureata in odontoiatria e protesi dentale. Responsabile del reparto di Chirurgia di Clinica Sorriso. Si occupa di diagnosi e terapia parodontale, di implantologia nei bambini e negli adolescenti.*

**CHIEDI UN CONSULTO**



[clinica.sorriso@medicinamoderna.tv](mailto:clinica.sorriso@medicinamoderna.tv)



➤ La radiografia evidenzia la posizione quasi orizzontale del canino.



➤ È evidente il completo recupero dell'arcata superiore, utilizzando la chirurgia abbinata alla ortodonzia.